

**Studienliste der Abteilung klinische Forschung  
Bereich Onkologie**

Studie	Typ	Schlagwort	Sponsor	Folgende Zentren rekrutieren Patienten
<b>Mamma CA</b>				
Alexandra - Impassion 30	Phase III	Studie zu der Behandlung von Atezolizumab (Anti-PD-L1 Antikörper) in Kombination mit einer adjuvanten, Anthrazyklin-/Taxan- basierten Chemotherapie im Vergleich zu einer alleinigen Chemotherapie bei Patienten mit operablem Triple-negativem Brustkrebs	Hoffmann-La Roche Ltd	St.Johannes-Hospital Dortmund
APTneo	Phase III	Atezolizumab, Pertuzumab und Trastuzumab mit Chemotherapie als neoadjuvante Behandlung von HER2-positivem frühem hohem Risiko und lokal fortgeschrittenem Brustkrebs	Fondazione Michelangelo	St.Johannes-Hospital Dortmund
Detect V / CHEVENDO	Phase III	Vergleich einer Chemo- vs. einer endokrinen Therapie in Kombination mit einer dualen HER2-gerichteten Herceptin® (Trastuzumab) und Perjeta® (Pertuzumab) - Therapie bei Patientinnen mit HER2-positivem + hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs	Ulm University Hospital	St.Johannes-Hospital Dortmund
GeparDouze	Phase III	Studie zur Untersuchung von Atezolizumab oder Placebo in Kombination mit einer neoadjuvanten Chemotherapie gefolgt von einer adjuvanten Monotherapie mit Atezolizumab oder Placebo bei triple-negativem Brustkrebs (TNBC)	GBG Forschungs GmbH	St.Johannes-Hospital Dortmund
Mesi-Strat	Register	Prospektive Blutserum- und Urinprobensammlung für die Verwendung im Rahmen von Forschungsvorhaben in Kooperation mit der Stiftung PATH	Stiftung Path	St.Johannes-Hospital Dortmund
Opal	Register	Register für fortgeschrittene, inoperable oder metastasierte Mammakarzinome bei erster systemischer Therapie	iOMedico	St.Johannes-Hospital Dortmund
neoMono	Phase II	Studie beim triplenegativen Mammakarzinom zum Vergleich eines Atezolizumab-Monotherapie-Windows vor einer Atezolizumab-Chemotherapie Kombination mit einer alleinigen Atezolizumab-Chemotherapie Kombination	palleos healthcare GmbH	St.Johannes-Hospital Dortmund
SASCIA	Phase III	Behandlung mit dem Antikörper-Medikament-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei Frauen mit frühem, HER2-negativem Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko nach einer Standardbehandlung im neoadjuvanten Setting	German Breast Group	St.Johannes-Hospital Dortmund
eMonarcher	Phase III	Abemaciclib in Kombination mit einer adjuvanten endokrinen Standardtherapie bei Patientinnen mit nodal-positivem, HR-positivem, HER2-positivem Hochrisiko-Brustkrebs im Frühstadium, die eine auf HER2 ausgerichtete adjuvante Therapie abgeschlossen haben.	Lilly Deutschland GmbH	St.Johannes-Hospital Dortmund